N° 21.

Observation sur une chutte du fondement.

Un Enfant âgé de trois ans et demi, + souffrant presque continuellement, depuis trois mois qu'il étoit chés Pere et Mere, des douleurs de ventre, souvent accompagnées de vomissement; fut attaqué, le 16 du courant d'un renversement assés considérable du rectum, que l'on nomme communement chutte du fondement. Je fus appellé, je reconnus l'intestin du côté de sa membranne intérieure. Je fis des tentatives, à deux reprises différantes dans la journée, pour en faire la réduction; le volume de la tumeur et les cris de l'Enfant s'y opposerent. Examinant la tumeur, je reconnus que la partie interne de l'intestin qui devoit rentrer la premiere fesoit un étranglement, à l'orifice duquel étoit une excroissance charnue comme carcinomateuse, du volume et de la couleur d'une mure, que j'essayai de faire rentrer la premiere. La resistance invincible me fit abandonner la partie. Je conseillai d'appliquer fréquemment des linges doux trempés dans du lait tiede ou de l'eau de guimauve. Le lendemain je fis de nouvelles tentatives, je ne réussis pas mieux que la veille. Je fis continuer les émolliens. La tumeur étant un peu plus volumineuse que je n'en n'avois vu aux chutes ordinaires du fondement et dont j'avois fait plusieurs fois la reduction, je l'examinai attentivement. la petitte ouverture froncée qui étoit presque au centre de cette tumeur, un peu plus du côté du Périnée, permettoit difficilement l'introduction du doigt, qui ne fesoit connoître qu'une espèce de cul de sac qui sembloit se prolonger sous l'excroissance charnue qui se présentoit au rebort exterieur du trou. au fond de ce cul de sac se fesoit sentir une tumeur assés dure, que l'on pouvoit prendre pour d'autres excroissances plus considérables ou pour des matières fécales accumulées. Le vomissement continuel de l'Enfant, à la moindre boisson qu'il prenoit et qui n'a pas coutume d'accompagner la chute du fondement, me donna lieu de penser que l'intestin, qui, n'étoit point étranglé par le sphincter de l'anus (car le doit poussé assés avant tournoit autour du rectum) pouvoit être étranglé par lui même et former un volvulus. Comme c'étoit jour d'Academie, je me proposois en en sortant de rassembler quelques uns de mes Confreres, qui, par des raisonnemens appuiés d'expériences trouveroient avec moi quelques moyens de soulager l'Enfant:

+ fils du nommé Mansette md. de vin rue de la huchette.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 56 n° 21

mais je fus averti de me trouver à une heure avec M.r Moreau chirurgien en Chef de l'hotel Dieu, qui m'ayant précédé de trois ou quatre minutes se fit faire le recit du fait. arrivé je lui fis briévement le recit de mes tentatives sans succès. je ne conferai pas avec lui comme je le croyois faire avec tout autre de mes confrères, son temps ne paroissoit pas lui permettre. Il proceda sur le champ à faire la reduction en comprenant toute la tumeur sous ses doigts. je crus qu'une grande expérience lui favoriseroit d'une reussite plus heureuse qu'à moi; mais des tentatives d'un quart d'heure n'eurent pas plus de Succès. lui fesant remarquer la petite ouverture dont j'ai parlé, il y fit peu d'attention, la considérant comme un petit cul de sac extraordinaire: y portant mon doigt je jugeai que c'étoit ~~l~~ l'interieur de la partie la plus éloignée de l'intestin que je croyois devoir etre repoussée la premiere. Dans mes tentatives j'y avois essayé; mais l'excroissance voisine et l'Etranglement s'i opposoient. Enfin M.r Moreau réintroduisit son doigt dans cette ouverture, redoubla ses forces pendant un demi quart d'heure, au bout duquel il parvint à faire rentrer toute la tumeur. Cette reduction faite ne me tranquilisa point pour la guerison de l'Enfant. je portai mon doigt aussitot après et je sentis que la tumeur, que j'avois ~~faite~~ observée au dessus du globe intestinal, qui formoit la tumeur extérieure, existoit encore. M.r Moreau y portant son doigt de nouveau fit quelques mouvement dans le rectum, que je conçus n'être capable que d'éloigner le volvulus que je soubçonnois sans le détruire: l'opération faite, ce volvulus que je n'oubliois point, la mutilation de l'intestin et la violence que M.r Moreau avoit été obligé d'employer pour la réduction, et que je n'aurois pas osé entreprendre, me firent craindre des accidents, particuliérement l'inflammation du rectum. Je portai mon prognostic en disant aux Parents que quoique la réduction faite du fondement, en conséquence de l'existance du volvulus que je soubçonnois, que je regardois toujours la vie de l'Enfant en grand danger. que l'on ne pouvoit cependant pas désespérer, que par un effet de la Nature le volvulus ne se détruisit, ce que la cessation du vomissement n'auroit fait connoître; mais sa continuation et l'impossibilité de donner plus d'un verre de lavement me firent désespérer.

Il est bon de sçavoir que pendant que l'enfant étoit en nourrice,
les Pere et Mere avoient appris qu'il avoit de fréquentes
coliques, que l'on soubçonnoit être causées par une descente et que
l'on eut à envoyer un Bandage. Des borborigmes considerables
et fréquentes donnoient occasion aux Pere et mere de porter
quelques fois la main sur le ventre, au moyen de la quelle
ils sentoient que quelques unes des parties contenües se
portoient d'un côté à l'autre: croyant que c'etoit des verres),
ils avoient mis en usage, quelques vermifuges.
En passant je dirai aussi que l'enfant avoit une hydrocele du côté
gauche, qui étoit diminué des deux tiers de l'application trois
ou quatre fois de compresses trempées dans un melange de
partie égalle d'eau de vie et d'eau de chaux que j'avois conseillée.
~~trois~~ ~~Environ~~ vingt quatre heures se sont passées, après la
réduction, sans que l'enfant ait pu retenir dans son estomac
la plus petite quantité de liquide et sans aller à la selle.
sur la fin il vomissoit une matiere grisâtre.
La mort, à laquelle je m'attendois, étant enfin survenue,
j'ai demandé à faire l'ouverture de l'enfant: j'aurois voulu
avoir plusieurs temoins éclairés; mais l'heure étoit incomode,
et les Parents étoient pressés. Je n'ai pu avoir que Mr.
Guienand+ qui m'a fait le plaisir d'être present à l'ouverture

+notre Confrere

du cadavre, à la quelle nous avons procédé lundy 21. dernier
en presence de trois Eleves en chirurgie. Ayant ouvert le
bas ventre, nous avons parcouru le canal intestinal;
n'ayant rien remarqué aux autres viceres. La couleur
du Jejunum étoit plus rouge que dans l'etat ordinaire et
encore plus l'Ileum; celui ci avoit cinq ou six taches noires
à quelques distance les unes des autres. Il étoit fort dilaté
et rempli d'air. Parvenu au Rectum, nous avons apperçu
sa partie superieure remplie par les intestins cœcum et
Colon. plutot que de poursuivre nos recherches sur la
nature du Volvulus; j'ai préféré emporter la piece tel
qu'elle s'est trouvée, pour la presenter à l'academie afin
qu'en l'Examinant elle eut une idée de la verité plus claire
que je n'aurois pu la donner.
L'hydrocele s'est aussi confirmeé.

a Paris ce 24. Juillet 1766. Robin

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

MM.rs Bordenave, fue et Sabatier, ayant examiné la pièce que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Academie. Nous avons trouvé dans la partie intestinale une invagination de l'intestin Cœcum et de la plus grande partie du Colon dans la derniere extremité de cet intestin et la partie superieure du Rectum. Elle commençoit à plus de onze pouces de l'anus et finissoit à cinq pouces et plus au dessus de cette partie. Il ne nous a pas été possible de retirer la partie invaginée de l'autre, parce qu'elle avoit contracté de fortes adhérences au dehors seulement. Il n'i avoit nulle adhérence intérieurement. L'Intestin Ileum abouché en conséquence de cette Maladie avec la derniere extremité du Colon étoit fort dilaté, et cette dilatation s'étendoit fort loin, comme je l'ai dit dans mon observation, au dessus dans le sujet. à la partie inférieure de l'intestin invaginée, qui a été reconnüe pour celle que j'ai décrite comme se présentant au dehors de l'anus pendant la vie du sujet, il y avoit une tumeur oblongue, de consistance mollasse, qui étoit à la tunique interne de l'intestin et paroissoit en faire partie. Ayant examiné depuis attentivement cette tumeur, elle nous a paru être formée particulierement par le renversement du Cœcum; et l'espèce d'ouverture que nous avons apperçüe étoit l'orifice d'un conduit formé par l'ileum retreci, et qui se continuoit le long de cette tumeur où elle présentoit une ouverture latérale. Il y a apparence que cette tumeur a été cause de l'invagination dont il s'agit. La partie invaginée ne communiquoit et ne s'ouvroit dans le rectum que par une ouverture étroite qui a été reconnüe pour celle que j'ai observée dans l'Enfant vivant.

à Paris ce 31. Juillet 1766.

Robin

Bordenave — Sabatier — Sue